



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOCHNI
„SZPITAL POWIATOWY”
im. bł. Marty Wieckiej
32-700 BOCHNIA, ul. Krakowska 31
Tel 14 615 33 52
endoskopia@szpital-bochnia.pl



KOLONOSKOPIA W ZNIECZULENIU

Kolonoskopia to badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego (jelita grubego) za pomocą kolonofiberoskopu, pozwalające ocenić błonę śluzową całego jelita grubego, co ma szczególnie znaczenie w profilaktyce i wczesnym rozpoznaniu chorób nowotworowych jelita grubego.

Na badanie należy zgłosić się z osobą towarzyszącą. Pacjent przez 12 godzin po znieczuleniu nie może prowadzić pojazdu mechanicznego, pracować na wysokości, podpisywać ważnych dokumentów. W celu uzupełnienia danych na 20 minut przed badaniem, należy zgłosić się do Rejestracji Centrum Endoskopii (wejście od dziedzińca - II piętro).

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: Zabrać ze sobą dowód osobisty, wyniki poprzednich badań endoskopowych jeśli takie były. Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu, polegającym na oczyszczeniu jelita grubego z resztek pokarmowych. W tym celu należy wykupić w aptece lek służący przygotowaniu do kolonoskopii– uwaga konieczna jest recepta. Najczęściej stosowane preparaty to wg kolejności alfabetycznej: Citra Fleet, Clensia, Eziclen, Fortrans, Moviprep, Olopeg. Wybór leku należy do lekarza i pacjenta, stosownie do ogólnego stanu zdrowia i ewentualnych chorób towarzyszących.

- na 7 dni przed planowaną kolonoskopią nie należy spożywać chleba gruboziarnistego, owoców ani warzyw pestkowych (np. ogórki, pomidory, winogrona, mak, kiwi, truskawki);
- w dniu poprzedzającym badanie: zjeść lekkie śniadanie, a na obiad zupełę - ostatni posiłek przed badaniem. Pomiędzy 15:00–23:00 wypić zalecany środek wg załączonej do niego ulotki rozpuszczony w niebarwiących, klarownych płynach np. woda niegazowana, sok jabłkowy.
- w dniu badania: **nic nie jeść i nie pić;**

Jeśli jelito nie jest odpowiednio przygotowane, co uniemożliwi wykonanie badania kolonoskopii, lekarz może odstąpić od wykonania badania lub wykonać badanie na krótszym odcinku jelita (np. sigmoideoskopię). Osoby chorujące na cukrzycę powinny dodatkowo skonsultować z lekarzem sposób przygotowania.

LEKI: Osoby przyjmujące leki obniżające krzepnięcie krwi (np. acenocumarol, sintrom, warfin, ticlid, xarelto i inne) powinny przerwać ich stosowanie na 7 dni przed badaniem; należy to jednak skonsultować z lekarzem prowadzącym. Konieczna może być zamiana tych leków na heparynę niskocząsteczkową (np. fraxiparyna, clexane). Należy również poinformować o tym lekarza badającego.

Osoby przyjmujące **METFORMINE - lek przeciwcukrzycowy (np. sio for, avamina, glucoophage, metfogamma, metifor i inne)** po konsultacji z lekarzem prowadzącym lub rodzinnym powinny odstawić lek na 24h przed badaniem.

BADANIA ANALITYCZNE: Do zabiegu wskazane jest wykonanie badań: **morfologia, glukoza, jonogram, układ krzepnięcia, TSH-** wyniki badań nie mogą być starsze niż 10 dni.

Pacjent zgłaszający się na badanie w znieczuleniu musi posiadać **ZAŚWIADCZENIE o stanie zdrowia i zażywanych lekach od lekarza kierującego/ rodzinnego.**

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o kontakt

- **osobisty:** pon-pt w godz. 7:00-14:30
- **telefoniczny:** pon-pt w godz. 10:30-14:00 pod nr tel.: **14 615-33-52**